


用藥指導單張

衛教小組 DD13430101

學名：Mesalazine

商品名：PENTASA PR 2G

中文名：頗得斯安持續性藥效顆粒劑



一、此藥品的用途是什麼？

潰瘍性結腸炎。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

疾病發作期治療劑量：

成人：

依據患者狀況給予個別的劑量。劑量可達每日給予4 g mesalazine，一次或分次給予。

平穩期維持治療劑量：

成人：依據患者狀況給予個別的劑量。建議劑量為 2 g mesalazine一天一次。亦可分次給予。

兒童族群：兒童(年齡介於6-18歲)之使用經驗有限。

疾病發作期治療劑量：

6歲以上兒童：依據患者狀況給予個別的劑量。初始劑量由每日每公斤體重給予30 mg-50 mg，分次給予。最大劑量：每日每公斤體重給予75 mg，分次給予。每日總劑量不應超過4 g (成人每日治療最大劑量)。平穩期維持治療劑量：6歲以上兒童：依據患者狀況給予個別的劑量，初始劑量由每日每公斤體重給予15-30 mg，分次給予。

每日最大劑量不應超過 2 g (成人建議劑量)。

一般體重小於40 kg之兒童建議使用劑量為成人劑量的一半；體重大於40 kg之兒童建議使用劑量與成人使用劑量相同。

服用指示：

1. PENTASA Sachet 不可咀嚼。
2. 應直接將小包內的顆粒劑倒在舌頭上。
3. 用水或果汁吞服。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 大部分對sulphasalazine有不耐症或過敏的患者使用PENTASA不會產生相似副作用的風險。然而，對sulphasalazine過敏的患者(對salicylates有過敏的風險)建議要小心使用本品。當出現急性不耐症如腹絞痛、急性腹痛、發燒、劇烈頭痛及皮疹時，應立即停止治療。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DD13430101

學名：Mesalazine

商品名：PENTASA PR 2G

中文名：頗得斯安持續性藥效顆粒劑



2. 對肝功能不全的患者建議要小心使用。根據醫師的評估在治療前和治療中須對肝功能指數如ALT或AST做評估。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

腹瀉、噁心、腹痛、頭痛、嘔吐及皮疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

在原包裝內儲存於30℃以下，避光保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師