


用藥指導單張

衛教小組 DD3700101

學名：Bisacodyl

商品名：DULCOLAX 5MG

中文名：樂可舒腸溶糖衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

暫時緩解便秘、診斷及手術前清腸。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人及10歲以上的兒童：1-2錠(5-10mg)

4-10歲兒童：1錠(5mg)

4歲以下兒童：建議使用1/2栓劑(5mg)

建議在晚上服用腸溶衣錠，翌晨即可排便，且必須整錠伴與適量的液體吞服。

用於診斷過程及手術前的準備：

成人：建議劑量為在檢查前夜睡前服用2-4顆腸溶糖衣錠，檢查當天再使用一個栓劑。

4歲及4歲以上兒童：建議在晚上服用一顆腸溶糖衣錠，翌晨再使用半個栓劑。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 錠劑必需整粒吞服不可咬碎。制酸劑如Sod bicarbonate和其他鹼性物質等因可溶解糖衣，故不可同時服用。
2. 婦女懷孕時服藥的安全性尚未確立，因此對於孕婦或可能有懷孕者，若能判斷於治療上有益勝於危險性時，始得始藥。
3. 因有誘發子宮收縮而有流產、早產之危險性，所以孕婦或可能已懷孕婦女，不得大量給藥。
4. 緩瀉劑治療期間若直腸出血，嚴重腹痛，或腸功能突然改變時，要馬上通知醫師。
5. 沒諮詢醫師的情況下，不要使用緩瀉劑超過1~2週，而且要避免產品無效時，擅自增加劑量，會發生緩瀉劑依賴性或電解質不平衡。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DD3700101

學名：Bisacodyl

商品名：DULCOLAX 5MG

中文名：樂可舒腸溶糖衣錠



五、此藥會造成什麼副作用？

可能會發生腹部不適，包括腸絞痛與腹痛(可能伴隨噁心及/或嘔吐)。曾發生腹瀉。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師