用藥指導單張

衛教小組 DL0940101

學　名：Fluoxetine

商品名：fluRONin 20MG

中文名：伏憂寧膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

肥胖症、飲食障礙。

抑鬱症、暴食症、強迫症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
最初治療時建議每天服用20mg，若病情超過數週沒有改善，可每天服用二次(早、晚)，總劑量不可超過80mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 不可與MAOI合併使用,或者停用MAOI後應至少隔14天以上才能開始使用本藥,且停用本藥後至少隔5週才能開始使用MAOI。
2. 本品主要經由肝臟代謝，經由腎臟排泄，所以肝、腎病人服用時宜小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 常見-頭痛、緊張、焦慮、失眠、噁心、腹瀉。
2. 偶有-發疹、蕁痲疹，其他還包括發燒、淋巴腺病變、蛋白尿、轉胺酶輕度上升、嗜睡、疲憊、震顫、眩暈、心悸、搔癢、肌痛、關節痛、性功能障礙。

六、此藥儲存時的條件為何？

一般藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所，冷藏藥品應置於攝氏 2 ~ 8 度冰箱內(勿冷凍)；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11