

用藥指導單張

衛教小組 DG0160201

學名：Dutasteride

商品名：Avodart 0.5mg(自費)

中文名：適尿通軟膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

治療具有症狀之攝護腺肥大症。而有緩解相關症狀、降低急性尿滯留之發生率、減少攝護腺肥大症相關手術必要性之效果。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

膠囊需整顆吞服，切勿嚼食或將膠囊打開；直接接觸膠囊內容物可能會對口咽部黏膜造成刺激。

AVODART 可與食物或不與食物一起服用。

建議劑量為一天口服一顆膠囊(0.5 毫克)。

AVODART 可以單獨使用或與 alpha blocker，例如 tamsulosin 合併使用，以治療攝護腺肥大症；tamsulosin 通常以 0.2mg 作為起始劑量，且 tamsulosin 之每日最高劑量不得超過 0.4mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

本品可經由皮膚吸收，因此婦女及小孩應避免接觸到裂損的膠囊，因為可能因此而吸收dutasteride，而且對男性胎兒可能造成胎兒異常的危險。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

輕度的勃起不能、性慾降低。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於 30℃ 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師