

用藥指導單張

衛教小組 DQ2320101

學名：Regorafenib

商品名：STIVARGA ★ F.C 40MG(健保事審)

中文名：癌瑞格膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

(1) 大腸直腸癌 Regorafenib適用於治療先前曾接受下列療法的轉移性大腸直腸癌(mCRC)病人，療法包含 fluoropyrimidine - , oxaliplatin - 和 irinotecan - 為基礎的化療，和抗血管內皮生長因子(anti - VEGF) 等療法；若KRAS為原生型(wild type)則須接受過抗表皮生長因子受體(anti - EGFR)療法。

(2) 腸胃道間質腫瘤適用於治療先前曾接受imatinib mesylate與sunitinib malate病人之局部晚期、無法切除或轉移性的腸胃道間質腫瘤病人。

(3) 肝細胞癌適用於治療曾接受sorafenib治療的肝細胞癌(HCC)病人。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一個服藥週期為 28 天，建議劑量為每個週期的前 21 天，每日一次口服 160 mg STIVARGA (四顆 40 mg 藥錠)。持續接受治療直到病況惡化或發生無法接受的毒性。請於每日同一時間服用STIVARGA。請在食用一份所含熱量不到600卡路里且所含脂肪不到 30%的低脂餐點後，配水吞服整顆藥錠[藥物動力學特性(11)]。請勿為了彌補前一日的劑量，而在一日內服用兩份劑量的STIVARGA。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 肝毒性

癌瑞格開始治療前須進行肝功能檢測(ALT、AST及膽紅素)，且在治療的前2個月，至少每兩週要監測一次；接下來，每月至少須監測一次或依照臨床需要增加頻率。肝功能檢測數值升高的病患，須每週進行肝功能檢測，直到數值低於正常值上限/基期的三倍。

2. 出血

出現重度或危及生命的出血症狀的病患，請永久停用癌瑞格。接受warfarin的病患須更頻繁偵測其INR值。

3. 皮膚毒性

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ2320101

學名：Regorafenib

商品名：STIVARGA ★ F.C 40MG (健保事審)

中文名：癌瑞格膜衣錠



因皮膚毒性暫停使用癌瑞格後，降低劑量或永久停藥的決定取決於皮膚毒性的嚴重性及持續時間而定。進行支持性療法以緩解症狀。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常出現的不良反應($\geq 20\%$)為全身無力/疲倦、HFSR、腹瀉、食慾降低/食物攝取減少、高血壓、粘膜炎、發音異常、感染、疼痛(無特別指定何種疼痛)、體重減輕、胃腸道與腹部疼痛、皮疹、發燒與噁心。

接受癌瑞格治療的患者中，最嚴重的藥物不良反應為肝中毒、出血及胃腸道穿孔。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於 30°C 以下，運送時的允許溫度範圍為 15 至 30°C (59 至 86°F)。

請將藥物儲存於原本的瓶子中，勿移除乾燥劑。首次開封後請鎖緊瓶蓋。

開瓶7週後，請將瓶中未使用的藥物丟棄。丟棄時請遵守當地規範。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師