用藥指導單張

衛教小組 DS13930101

學　名：Finerenone

商品名：KERENDIA 20MG(自費)

中文名：可申達膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

用於第二型糖尿病 (T2D)相關的慢性腎臟病(CKD)的成年病人，可降低持續性腎絲球過濾率(eGFR)下降、末期腎病(ESKD)、心血管死亡、非致命性心肌梗塞以及因心衰竭住院的風險。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下:
根據eGFR判定Kerendia 的建議起始劑量，eGFR ≥60: 每天1次20毫克，eGFR ≥25至<60: 每天1次10毫克，eGFR <25: 不建議使用。

無法以口吞服整粒藥錠的病人，本藥品可磨碎後與水或軟質食物(如蘋果泥) 混和後立即服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

高血鉀症

Kerendia 可能導致高血鉀症。發生高血鉀症的風險隨著腎功能下降而增加，並且在基期鉀濃度較高或其他有高血鉀症風險因子病人中的風險更高。開始Kerendia 治療前測量所有病人的血清鉀濃度和eGFR並相應給藥。若血清鉀> 5.0 mEq/L，請勿開始使用Kerendia；若病人血清鉀濃度> 4.8 至5.0 mEq/L，則可考慮開始Kerendia 治療，並根據病人特徵以及血清鉀濃度在開始治療的4 週內進行額外血清鉀監測。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

高血鉀。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於30° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15