
用藥指導單張

衛教小組 DS16430101

學　名：Torsemide

商品名：TORSIX（注射）20MG/2ML

中文名：妥速適注射液



一、此藥品的用途是什麼？

治療鬱血性心臟衰竭，腎疾病、肝臟疾病及慢性腎衰竭引發的水腫症狀，高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

鬱血性心衰竭：

起始劑量每次 10 mg 或 20 mg，一天一次，1. 當病人利尿效果不佳時，可將使用劑量加倍。2. 單劑量使用量最高不可超過 200 mg。

慢性腎衰竭：

起始劑量每次 20 mg，一天一次，1. 當病人利尿效果不佳時，可將使用劑量加倍。2. 單劑量使用量最高不可超過 200 mg。

肝硬化：

起始劑量每次 5 mg 或 10 mg，一天一次，1. 建議與 Aldosterone antagonist 或鉀保留利尿劑合併使用。2. 當病人利尿效果不佳時，可將使用劑量加倍。3. 單劑量使用量最高不可超過 40 mg。

高血壓：

起始劑量每次 5 mg，一天一次，應盡快將給藥方式轉為口服給予。

使用Torsemide注射液，以靜脈輸注方式使用時，需至少持續2分鐘以上。

三、使用時我該注意的特別事項？

當病人接受Torsemide治療，需定期監測血清中鉀濃度以及其他電解質是否有出現異常的情形。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

頭暈、頭痛、噁心、衰弱、嘔吐、高血糖、尿液過多。

六、此藥儲存時的條件為何？

於25℃以下儲存，請勿冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15