用藥指導單張

衛教小組 DA1050201

學　名：azilsartan

商品名：EDARBI 40MG

中文名：易得平錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 建議起始劑量為每天一次，每次 20-40 mg。須依病患臨床反應調整劑量，最大劑量為每天一次、每次 80 mg。
2. 易得平錠為口服使用，可與食物或空腹服用。
3. 2 週時可明顯見到接近最大程度的降壓效果，4週時可達到最大效果。

三、使用時我該注意的特別事項？

根據其藥效學特性，我們預期 azilsartan medoxomil 對駕駛及機械操作的能力，幾乎沒有影響。但服用任何降壓藥物，皆應考慮到偶爾會有暈眩或疲倦的情況。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

暈眩、腹瀉、周邊水腫。

六、此藥儲存時的條件為何？

30℃以下。請存放於原包裝內，以避免光照及潮濕。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03