用藥指導單張

衛教小組 DH13700101

學　名：Clomifene

商品名：CLOMIPHENE 50MG

中文名：喜妊錠



一、此藥品的用途是什麼？

促進排卵(排卵障害引起之不孕症)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

誘發排卵

第一治療期：自月經來潮第五天開始服藥，每天一錠，連服五天。

第二治療期：前次服用後未達排卵之目的，應於下次月經來潮後第五天再度服藥，每天二錠，連服五天。

第三治療期：經二次治療，未達排卵者，除非有其他錯誤診斷或病人未遵守指導，可再進行第三次治療，其用法、用量與第二治療期相同。

三、使用時我該注意的特別事項？

需慎重服藥者：

1. 既有肝疾患，肝臟障礙患者。
2. 具多囊胞性卵巢症候群患者。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：　不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 卵巢過分刺激：如出現下腹部痛等之卵巢腫大症者應停止用藥。
2. 眼：霧視等視覺症狀出現時應即停藥，並請眼科醫師檢查之。
3. 過敏症：發疹現象者應即停藥。
4. 肝臟：至目前約有5%以上患者出現BSP排泄遲延。
5. 胃腸：偶有噁心、嘔吐、食慾不振等現象。
6. 精神神經系：時有頭痛、情緒不安等現象。
7. 其它:偶有顏面潮紅、尿量增加、口渴、疲勞感等現象。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25

用藥指導單張

衛教小組 DH13700101

學　名：Clomifene

商品名：CLOMIPHENE 50MG

中文名：喜妊錠



六、此藥儲存時的條件為何？

於25℃以下、避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25