用藥指導單張

衛教小組 DA13440101

學　名：Tolvaptan

商品名：SAMSCA 15MG

中文名：伸舒康錠



一、此藥品的用途是什麼？

SAMSCA適用於治療心臟衰竭及抗利尿激素分泌不當症候群引起之低血鈉症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
病人應在醫院中開始或重新開始進行治療，以評估治療反應，及由於低血鈉症矯正速度過快可能會引起滲透壓去髓鞘症候群(osmotic demyelination)，繼而導致發音困難、失語、吞嚥困難、嗜睡、情緒改變、痙攣性四肢麻痺、癲癇發作、昏迷及死亡。

SAMSCA一般起始劑量為15毫克，每日給藥一次，並且不須考慮進食時間。可將劑量增加至30毫克每日一次，經過至少24小時之後，視升高至需求血清鈉濃度的需要，可再增加至最高劑量60毫克每日一次。為減少肝損傷之風險，投與SAMSCA不要超過30天。

在開始治療與劑量調整期間，應經常監測血清電解質與血液容積的變化。血鈉濃度矯正速度必須限制在起初24小時內小於10~12 mEq/L及起初48小時內小於18 mEq/L，其他有關治療低血鈉的重要訊息，請務必參考現行低血鈉症的治療指引。在最初24小時的治療期間，應避免限制水分攝取。應告知接受SAMSCA治療的病人，他們可以依口渴的狀況，繼續攝取水分。

三、使用時我該注意的特別事項？

服用SAMSCA的病人應避免服用葡萄柚汁。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

口乾、便秘、高血糖、多尿、食慾降低。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於25℃，容許儲存溫度範圍為15℃-30℃。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.22