用藥指導單張

衛教小組 DR9440201

學　名：Fentanyl

商品名：FENTANYL INJ★ 0.05MG/ML 10ML(大AMP))(管藥二)

中文名：吩坦尼注射液



一、此藥品的用途是什麼？

麻醉和麻醉前給藥、急性疼痛之緊急治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
此藥的劑量移依據患者年齡、體重、身體狀況、內在疾病，是否併用其他藥物，手術及麻醉種類而定。

三、使用時我該注意的特別事項？

假如病人未使用足量的抗膽鹼藥物或本品與非迷走神經鬆解之肌肉鬆弛劑併用，會發生心跳緩慢，且可能會心臟收縮不全。可用atropine治療心跳緩慢。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

肌肉僵直(可能包括喉部肌肉)、肌陣攣運動、暈眩、低血壓、心跳過慢、窒息、呼吸抑制。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.14