用藥指導單張

衛教小組 DA2430101

學　名：Atorvastatin

商品名：ATORVASTATIN (LIPITOR) 40MG(高劑量)

中文名：立普妥膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

高膽固醇血症，高三酸甘油酯血症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一般-使用本品治療之前，必須嘗試用適當的飲食控制、運動，以及肥胖的患者減重等方法，來控制高膽固醇血症，並且治療其他潛在的疾病。患者在atorvastatin治療期間，仍須接受標準的降膽固醇飲食治療。劑量範圍是atorvastatin 10-80 mg，每日服用一次。服藥時間早晚不拘，隨餐或空腹均可。起始劑量和維持劑量應根據患者LDL-膽固醇的基礎值、治療目標與治療成效個別調整。

原發性高膽固醇血症及混合型高脂血症

大多數患者用atorvastatin 10 mg每日服用一次的劑量就控制得很好。明顯的治療效果在兩週之內出現，而最大的治療效果通常在四週之內出現。在長期治療期間仍持續這種治療效果。

同型接合子家族型高膽固醇血症

一項針對同型接合子家族型高膽固醇血症患者服用本品的恩慈使用研究顯示，大多數患者對atorvastatin 80mg具有降低LDL膽固醇大於15%以上(18-45%)的療效反應。

異型接合子家族型高膽固醇血症兒童患者(10-17歲)

建議起始劑量為10mg/日，最高建議劑量為20mg/日(大於20 mg的劑量未曾在此患者群中做過研究)，且應根據治療目標個別調整劑量，應間隔4週或更久做一次劑量調整。

三、使用時我該注意的特別事項？

服藥期間，請勿吃葡萄柚或喝含葡萄柚汁的飲料。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：　不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

肌痛、腹瀉、噁心、丙胺酸轉胺　升高、以及肝臟酵素升高。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

用藥指導單張

衛教小組 DA2430101

學　名：Atorvastatin

商品名：ATORVASTATIN (LIPITOR) 40MG(高劑量)

中文名：立普妥膜衣錠



請置於30°C下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02