

用藥指導單張

衛教小組 DL15270101

學名：Risperidone

商品名：OKEDI 100MG (高劑量)

中文名：歐克蒂持續性藥效肌肉注射懸浮劑100毫克



一、此藥品的用途是什麼？

用於已使用口服 risperidone 確立耐受性和有效性之思覺失調症的成人病人。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

OKEDI 僅用於肌肉內給藥，不得以靜脈或皮下途徑或任何其他途徑給藥。

OKEDI 應每 28 天透過肌內 (IM) 注射施用。

OKEDI 應根據病人的臨床情況啟用：

曾對 Risperidone 產生療效反應，且目前以口服抗精神病藥物達到穩定（精神病症狀為輕度至中度）的病人。

以口服 risperidone 達到穩定的病人，無需事先調整劑量即可轉用 OKEDI。以其他口服抗精神病藥物（與 risperidone 不同者）達到穩定的病人，在開始使用 OKEDI 治療前，應先使用口服 risperidone 進行劑量調整。劑量調整期長度應充足（至少 6 天），以確認對 risperidone 的耐受性和反應性。

從未接受口服 risperidone 治療的病人

對於有機會接受 OKEDI 且之前未曾接受 risperidone 治療的病人，在開始 OKEDI 的治療前，必須先用一段口服 risperidone 治療期確認對 risperidone 的耐受性和反應性。建議劑量調整期長度應至少為 14 天。

從口服 risperidone 換成 OKEDI

維持相似活性部分穩定態暴藥量所需的口服 risperidone 和 OKEDI 建議劑量如下：

先前口服 risperidone 3mg/日的劑量，換成 OKEDI 注射劑 75 mg 每 28 天一次

先前口服 risperidone 4 mg/日，換成 OKEDI 注射劑 100mg 每 28 天一次

OKEDI 必須在最後一劑口服 risperidone 的約 24 小時後啟用。

OKEDI 可每 28 天進行一次劑量調整。通常建議採用 OKEDI 75 mg 每 28 天一次的維持劑量。不過，視病人的臨床反應和耐受性而定，有些病人可從每 28 天 100 mg 的 OKEDI 劑量中獲益。使用時不建議給予起始劑量，也不建議給予補充性口服

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL15270101

學名：Risperidone

商品名：OKEDI 100MG (高劑量)

中文名：歐克蒂持續性藥效肌肉注射懸浮劑100毫克



risperidone。

從 OKEDI 換成 服 risperidone

當病 從 OKEDI 注射劑換回 服 risperidone 療法時，必須考慮 OKEDI 製劑的緩釋特性。

般，建議在最後 劑OKEDI的28天後開始進 服 risperidone 治療。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

血中泌乳激素升、泌乳激素 症、靜坐不能、頭痛、嗜睡、體重增加、注射部位疼痛和頭暈。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於低於25°C 之環境。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師