

用藥指導單張

衛教小組 DQ12100101

學名：Fulvestrant

商品名：FASLODEX ★ INJ 250MG/5ML (自費)

中文名：法洛德注射液



一、此藥品的用途是什麼？

治療已接受輔助性抗雌激素療法，但疾病仍復發，或使用抗雌激素療法但疾病仍惡化的停經婦女，且其雌激素受體為陽性的局部晚期或轉移性乳癌。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成年婦女(包括老年人)：建議第一個月劑量為500mg每兩週一劑，第二個月之後劑量為500mg一個月一次。

給藥方法：

投與 FASLODEX 應以兩次連續的 5 毫升在臀部(臀部肌肉處)施行緩慢肌肉注射（1-2 分鐘/注射），一邊一次。

於背臀部注射部位投與 FASLODEX 時應注意鄰近下方的坐骨神經。

三、使用時我該注意的特別事項？

FASLODEX對駕駛或操作機械能力沒有影響或影響微乎其微。但使用 FASLODEX治療，衰弱無力的報告很常見。因此，有此不良反應的患者在駕駛或操作機械時須小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常通報的不良反應是注射部位反應、衰弱無力、噁心及肝酵素 (ALT, AST, ALP) 上升。

六、此藥儲存時的條件為何？

2~8℃ 儲存。(置於冰箱冷藏)

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師