


用藥指導單張

衛教小組 DJ12420101

學名：Ibuprofen

商品名：IBUPROFEN ORAL SUSP. 20MG/ML, 60ML

中文名：依普芬口服懸液劑



一、此藥品的用途是什麼？

消炎、鎮痛、解熱。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

嬰幼兒：6 個月到 12 歲：體溫 39℃以下，每公斤服 0.25 毫升，每 6~8 小時一次。

體溫 39℃以上，每公斤服 0.5 毫升，每 6~8 小時一次。一天每公斤最大服用量為 2 毫升。

幼年型關節炎：每公斤每天 1.5~2 毫升，分 3~4 次服用。

成人：發燒：每次 20 毫升，每 4~6 小時一次。

月經痛：每次 20 毫升，每 4~6 小時一次，必要時每 4 小時一次。風濕性關節炎：每次 15~40 毫升，每天 3~4 次。

每日最大劑量不建議大於 2400mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

慎重投與：

1. 曾有消化性潰瘍病歷之患者。
2. 患有血液異常或曾有此種病歷之患者。
3. 患有肝障害或曾有該病歷之患者。
4. 心機能障害之患者。
5. 曾有過敏症病歷之患者。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 能會產生 Stevens-Johnson 症候群（發熱、皮膚黏膜發疹、紅斑、壞死性結膜炎等症候群）、Lyell 症候群（中毒性表皮壞死症）、發疹或誘發氣喘等症狀，遇有此等過敏症狀出現時，必須立刻停藥。
2. 可能會引起胃腸出血，遇有此等現象，必須立即停藥。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DJ12420101

學名：Ibuprofen

商品名：IBUPROFEN ORAL SUSP. 20MG/ML, 60ML

中文名：依普芬口服懸液劑



六、此藥儲存時的條件為何？

應儲存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師