
用藥指導單張

衛教小組 DM5540301

學　名：Bisacodyl

商品名：BISACODYL SUPP 10MG

中文名：無秘栓劑



一、此藥品的用途是什麼？

(1)便秘，起因於臥床、食物改變、環境改變、重病、熱病等各種便秘，痔病時之誘導下瀉。(2)生產前，手術前，X光檢查或直腸鏡檢前的結腸準備。

暫時緩解便泌。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
栓劑—如需即時排便時可使用坐劑。在手術前，X光檢查前，或對臥病患者，此為一方便有效之灌腸代用品。成人：通常用量為10gm栓劑一個。只在特殊情下需要二個。在30分鐘後即可引起排便。小兒：使用5mg小兒用栓劑。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 婦女懷孕時服藥的安全性尚未確立，因此對於孕婦或可能有懷孕者，若能判斷於治療上有益勝於危險性時，始得始藥。
2. 因有誘發子宮收縮而有流產、早產之危險性，所以孕婦或可能已懷孕婦女，不得大量給藥。
3. 緩瀉劑治療期間若直腸出血，嚴重腹痛，或腸功能突然改變時，要馬上通知醫師。
4. 沒諮詢醫師的情況下，不要使用緩瀉劑超過1～2週，而且要避免產品無效時，擅自增加劑量，會發生緩瀉劑依賴性或電解質不平衡。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

腹痛，過敏，直腸刺激感。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19


用藥指導單張

衛教小組 DM5540301

學　名：Bisacodyl

商品名：BISACODYL SUPP 10MG

中文名：無秘栓劑



六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19