

用藥指導單張

衛教小組 DE6720201

學名：Insulin aspart

商品名：novoRAPID ★(橘) FLEXPEN

中文名：諾和瑞諾易筆



一、此藥品的用途是什麼？

糖尿病。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

治療患有糖尿病之成人、青少年及2歲以上之孩童。

1. 本品是一種速效型胰島素類似物。
2. 本品的劑量是按照個別情況與患者的需要而決定。其常與中效型或長效型胰島素併用治療，至少一天一次。建議進行血糖監控與胰島素劑量調整以達到最佳的血糖控制。
3. 根據患者個別需要，成人與孩童的胰島素需求量通常為 0.5至 1.0 U/kg/day。
4. 由於起始作用時間較快，本品應在餐前立即投予。需要時，本品可在餐後立即投予。
5. 本品以皮下注射方式注射在腹壁、大腿、上臂、三角肌或臀部。相同部位的注射點必須一直輪替，以降低發生脂肪病變的風險。

三、使用時我該注意的特別事項？

如同一般的胰島素治療，注射部位不良反應可能會發生，包括疼痛、變紅、瘀傷、腫脹及搔癢。同一部位的注射點不停地輪替可以減少或是預防這些不良反應。不良反應通常在數天到數星期內就會恢復。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常發生的不良反應為低血糖。

六、此藥儲存時的條件為何？

未使用狀態下的儲存：

儲存於冰箱中(2° C至8° C)。不要太靠近冷凍庫。不可冷凍。

使用中或隨身攜帶備用時的儲存：

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DE6720201

學名：Insulin aspart

商品名：novoRAPID ★(橘) FLEXPEN

中文名：諾和瑞諾易筆



使用中或隨身攜帶備用時的本藥品不可存放於冰箱。在室溫下(低於30° C)儲存可達4星期。請將本注射劑的筆蓋蓋上以避光。本藥品應避免過熱及避光。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師