

用藥指導單張

衛教小組 DM8630301

學名：Atropine

商品名：ATROPINE 1MG/1ML(注射)

中文名：硫酸阿托品注射液



一、此藥品的用途是什麼？

膽石症、幽門痙攣、胃酸過多、胃痙攣、有機磷化物、毛果芸香鹼中毒、診斷用散瞳、調節痙攣、乙醚等麻醉時之抑制支氣管分泌。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一般成人劑量

抗蕁毒鹼劑：肌肉、靜脈或皮下注射，400~600mcg，每4~6小時一次。

抗心律不整劑：靜脈注射，400mcg (0.4mg)~1.0mg，視需要每1~2小時一次，必要時可提高劑量至最大量2.0mg。

胃腸道低張性放射線照相：肌肉注射，1.0mg。

麻醉前給藥：肌肉注射，200~600mcg (0.2~0.6mg)，手術前1/2~1小時給藥。

解毒劑（有機磷殺蟲劑）：肌肉或靜脈注射，1.0~2.0mg，每20~30分鐘反覆給藥直到發疔消失，繼續給藥直到確切改善，有時需2天或更久。

解毒劑（蕁毒菇之蕁毒鹼）：肌肉或靜脈注射。1.0~2.0mg，每小時一次，直到呼吸效應產生。

三、使用時我該注意的特別事項？

服用此藥因會使人思睡及視力模糊，患者需避免從事需精神集中或視力敏銳之工作。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

視力模糊、便秘、口乾。

六、此藥儲存時的條件為何？

請貯存在15~30℃，避免冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師