
用藥指導單張

衛教小組 DM3910101

學　名：Benzbromarone

商品名：eurICON 50MG

中文名：優力康錠



一、此藥品的用途是什麼？

痛風、高尿酸血症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
一天1-3次，一次1錠。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 急性痛風發作時，不可開始使用本劑。
2. 本品具有顯著的血中尿酸降低作用，投與初期有誘發痛風之可能。
3. 尿呈酸性之場合，患者可能會因尿酸結石產生血尿，易引起腎絞痛等之症狀，為防止這種情況發生，須增加水分之攝取，使尿量增加及尿液鹼化。但是在此情況下，須注意患者酸和鹽基之平衡。
4. 開始投與本藥品前應先進行肝功能檢查，以確認病人沒有肝功能異常。
5. 長期投與時，應定期施行肝機能之各種檢查。
6. 腎功能異常之患者，建議酌予減量。
7. 重度肝功能異常之患者應小心使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

偶有蕁麻疹、發疹、顏面發紅、紅斑、搔癢感。

六、此藥儲存時的條件為何？

請於25℃以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11