

用藥指導單張

衛教小組 DE0050101

學名：Glimepiride

商品名：AMARYL★ 2MG

中文名：瑪爾胰錠



一、此藥品的用途是什麼？

非胰島素依賴型（第2型）糖尿病。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

開始時每天服用1mg glimepiride，如病情控制良好，可維持此劑量繼續治療。依據血糖控制的情形判斷，若治療情況不理想時，則應提高劑量，每隔1-2週，逐步增加劑量至每日2，3或4mg glimepiride。僅有特殊之病例，須使用每日劑量超過4mg glimepiride，才能得到較佳之治療效果。Glimepiride每日最高之建議劑量為8mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 為達到理想的血糖控制，正確的飲食、規律且足夠的運動、以及減輕體重(若必要時)，與按時服用本品是同樣重要的。血糖降低不夠(高血糖)的臨床徵狀包括：小便頻率增加、極度口渴、口乾、及皮膚乾燥。2. 治療初期，發生低血糖的危險性可能會升高，必須特別小心監控。如果出現低血糖的危險因子，可能須要調整劑量或調整整個治療的方式。3. 在特殊的緊急狀況下，血糖控制可能會惡化，且可能必須暫時改用胰島素。4. 以本品治療期間，必須定期檢查血糖值與尿糖值，此外，亦應檢查糖化血紅素。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見的不良反應為低血壓(0.9~1.7%)、眩暈(1.7%)、衰弱(1.6%)、頭痛(1.5%)及噁心(1.1%)。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DE0050101

學名：Glimepiride
商品名：AMARYL★ 2MG
中文名：瑪爾胰錠



六、此藥儲存時的條件為何？

一般藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所，冷藏藥品應置於攝氏 2 ~ 8 度冰箱內(勿冷凍)；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師