用藥指導單張

衛教小組 DM14070101

學　名：Cefixime

商品名：CEFIXMYCIN 100MG

中文名：喜復黴素膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

Streptococcus spp., S.pneumoniae, N.gonorrhoeae, Branhamella catarrhalis, E. coli, Klebsiella spp., Serratia spp., Proteus spp., H. influenzae菌當中，由Cefixime感受性菌引起之下述感染症：支氣管炎、支氣管擴張症（感染時）、慢性呼吸系疾病的繼發性感染、肺炎、腎盂腎炎、膀胱炎、細菌性尿道炎、中耳炎、副鼻竇炎。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
通常，對於成人及體重30kg以上的小兒，以Cefixime，1次50　100mg（力價），一日口服2次。但可依年齡、體重、症狀適宜增減之。重症或推測效果不彰之病例，以Cefixime，1次200mg（力價），一日口服2次。

三、使用時我該注意的特別事項？

下列患者請勿給藥有過因本藥之成分而引起休克病史之患者。 2. 原則上，下列患者請勿給藥，但是有特別必要時，應慎重給藥對本藥之成分或Cephem類抗生素有過敏病史之患者。 3. 下列患者應慎重給藥 (1) 對Penicillin類抗生素有過敏病史之患者。 (2) 本人、父母或兄弟姊妹有易發支氣管氣喘、發疹、蕁麻疹等過敏體質之患者。 (3) 有重度腎障礙之患者。 (4) 不能正常進食之患者或非經口攝取營養之患者、全身狀態不良之患者（因可能會出現維他命K缺乏症狀，故須嚴密觀察。） (5) 老年人。 4. 重要之基本注意事項可能會有出現休克之虞，故須詳細問診。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

腹瀉、發疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。 2. 25℃以下儲存。 3. 請在有效期限內使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26