用藥指導單張

衛教小組 DG10750101

學　名：Silodosin

商品名：URIEF F.C. 8MG(高劑量)

中文名：優列扶膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療前列腺肥大症所伴隨的排尿障礙。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 成人以1日2次，1次4毫克於早晚餐後或1日1次，1次8毫克於餐後口服投與本品，可依病患症狀適當減少劑量。

2. 腎功能不全：中度腎功能不全者(CCr 30-50 mL/min)服用本品已有Silodosin血中濃度上昇的報告。中度腎功能不全者，建議以低劑量(1次2 mg，1日2次)作為治療的開始劑量。輕度腎功能不全者(CCr 50-80 mL/min)無須調整劑量。

3. 肝功能不全：嚴重肝功能不全者(Child-Pugh score≧10)使用本品的臨床研究未執行，因此本品禁用於重度肝功能不全者。中度及輕度肝功能不全者(Child-Pugh score= 7~9)無須調整劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品剛開始使用時，可能引起起立性低血壓，因此服用本品的初期，患者駕駛車輛、操作機械或從事較危險的工作時須小心。

2. 中度腎功能障礙者，有silodosin血中濃度上昇的報告，須調整劑量。 3. 重度肝功能不全者(Child-Pugh score≧10)使用本品的臨床研究未執行，因此本品禁用於重度肝功能不全者。

4. 禁止與強效CYP3A4抑制劑(如ketoconazole、clarithromycin、itraconazole、ritonavir)併用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

常見副作用為射精障礙(逆行性射精等)、口渴、下痢、軟便、起立時有頭暈。

六、此藥儲存時的條件為何？

請保存於密閉容器、避光、25°C以下及兒童伸手不及之處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.29