用藥指導單張

衛教小組 DM10420101

學　名：Gentamicin

商品名：GENTAMYCIN（注射）INJ 80MG 2ML

中文名：健達黴素注射液



一、此藥品的用途是什麼？

革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
1日20~80mg（力價）分2~3回肌肉注射，亦可點滴靜注小孩1次0.4~0.8mg/Kg，1日2~3回肌肉注射，點滴靜注時以30分~2小時注入；投與期間7~10日，請勿超過10日。本藥限由醫師使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 注射部位可能有硬結，注射時請小心注意。
2. 本品要靜脈注射時通常以生理食鹽水5% Dextrose注射液稀釋其它經確定不產生配合變化的有Ringer液，20%果糖注射液，5-10% Xylitol，乳酸Ringer液，20% D-Mannitose注射液等。
3. 下列患者請勿投予，如有投予必要的場合請慎重給予;本人或其家族曾有Streptomycin聽覺困難或其他聽覺困難者。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 休克:偶有休克症狀出現，請小心觀察，呼吸困難、胸內苦悶、心悸亢進、血壓低下之症狀出現之場合，請中止使用。
2. 過敏:過敏症狀出現時，請中止使用。
3. 腎臟:偶有腎障害出現，請小心觀察。
4. 精神神經系:可能有眩暈、耳鳴、聽覺障害第8對腦神經障害，請小心觀察。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.13

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital