


用藥指導單張

衛教小組 DA14280201

學名：Prasugrel

商品名：EFIENT OD ★ F.C 20MG(高劑量)(自費)

中文名：抑凝安口溶錠



一、此藥品的用途是什麼？

適用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的急性冠狀動脈症候群(ACS；不穩定型心絞痛[UA]、非ST段上升之心肌梗塞[NSTEMI]或ST段上升之心肌梗塞[STEMI])。

適應症相關注意事項

當醫師根據冠狀動脈攝影結果，決定採用保守治療或冠狀動脈繞道手術來取代PCI時，應停止使用Efient。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Efient的起始劑量為單次使用20 mg口服劑量，隨後的維持劑量則採用每日一次3.75mg口服劑量。

用法用量相關注意事項

1. Efient應合併aspirin使用(81-100mg/天，起始劑量最多為324 mg)。
2. 在進行PCI之前，已經接受Efient 3.75 mg劑量約5天的病人，不需要使用起始劑量(即治療第一天的起始劑量20mg)。Efient所引發的血小板凝集抑制作用，預計會在5天內達到穩定狀態。
3. 不建議於空腹情況下使用Efient，使用起始劑量時除外。空腹狀態相較於飽足狀態用藥會有較高的最高血中濃度(Cmax)。
4. 體重偏低的病人(體重 $\leq$ 50 kg)其出血風險可能較高。目前對此族群尚無足夠資料以提供建議劑量。
5. Efient口溶錠可在不配水的情況下服用，因為它在舌頭上經唾液濕潤後會崩解。Efient口溶錠也可以配水服用。
6. 臥躺時，請勿在沒有配水的情況下服用Efient口溶錠。

三、使用時我該注意的特別事項？

重要注意事項

1. 考量到Efient的藥理作用（抑制血小板凝集），應注意以下幾點：請留意起始劑量和aspirin併用時，可能會增加出血的風險。

如果起始劑量的給予時間在冠狀動脈攝影之前，請留意因為Efient所引發的血小板凝集抑制作用，會導致出血風險升高，如穿刺部位出血

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DA14280201

學名：Prasugrel

商品名：EFIENT OD ★ F.C 20MG(高劑量)(自費)

中文名：抑凝安口溶錠



等。在針對NSTEMI病人的國外臨床試驗(ACCOAST試驗)中，相較於PCI時直接給予國外標準起始劑量60 mg，若將起始劑量分別在冠狀動脈攝影約4小時前給予起始劑量30 mg以及在PCI時給予另外起始劑量30 mg，會造成術間嚴重出血的風險升高，而無實質效益。

註：Efient的核准起始劑量為20 mg，維持劑量為每天3.75 mg。

Efient所引發的血小板凝集抑制作用，可能會對要接受手術的病人造成問題，建議臨床醫師在術前至少14天停止使用Efient。無充分時間停藥的病人，由於嚴重出血風險升高，應接受嚴密的觀察。停止用藥的病人發生血栓和栓塞的風險較高，所以應採取適當措施。針對術後重新使用Efient的病人，在恢復治療之前，請先確認手術部位已止血。

抗凝血劑、aspirin和Efient併用時應謹慎，因為併用可能會增加出血風險。

如果認為病人的出血風險偏高，應考慮停止治療。

如果臨床症狀顯示疑似出血，應立即進行適當的檢測如血球評估。

請向病人說明使用Efient可能會比平常更容易發生出血，並告知他們在出現異常出血時聯絡他們的醫師。教導病人到其他醫院部門或診所就診時，告知醫師自己正在服用Efient。

2. Efient可能造成血栓性血小板低下紫斑症(thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP)和其他臨床重要不良反應。在Efient治療開始的前2個月，請考慮約每兩週進行一次血液檢測。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

皮下出血、流鼻血、血尿、血管穿刺部位血腫以及皮下血腫。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於25°C以下。

打開鋁袋包裝後，應將Efient口溶錠存放在防潮處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師