

用藥指導單張

衛教小組

學名：Clarithromycin

商品名：CLARICIN 250MG

中文名：特立適膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

上、下呼吸道有感受性細菌所引起之感染症。可與Omeprazole併用治療幽門螺旋桿菌（H. PYLOR）有關之十二指腸潰瘍。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 成人及12歲以上兒童一般建議劑量為250mg膜衣錠，每天二次，每次一錠。較嚴重之感染，劑量可增加至500mg每天二次。一般療程為5-14天，但社區型的肺炎和鼻竇炎的治療需治療6-14天。
2. 肌酸酐廓清率低於30mL/min之腎功能不全患者，本品之劑量須減半，即250mg每天一次，或在較嚴重的感染以250mg每天兩次。這些病患不得連續使用超過14天。
3. 受分枝桿菌感染之病患：受分枝桿菌感染的成人其建議劑量為500mg每天二次。
4. 根除幽門螺旋桿菌之建議劑量範圍為：

三合一療法

Clarithromycin 500 mg每天二次併服lansoprazole 30 mg每天二次及amoxicillin 1000 mg每天二次使用10天。 Clarithromycin 500 mg每天二次、amoxicillin 1000 mg每天二次及omeprazole 20 mg每天二次一起服用7到10天。

二合一療法

Clarithromycin 500 mg每天三次和omeprazole每天40 mg，一起服用14天，接下來的14天每天服用omeprazole 20 mg或40 mg。 Clarithromycin 500 mg每天三次與lansoprazole每天60 mg一起服用14天。

要完全的使潰瘍復原，則可能需要進一步的酸抑制。

三、使用時我該注意的特別事項？

在未對懷孕婦女小心衡量治療效益及危險性，特別是在懷孕的前3個月內，醫師不應對懷孕婦女開clarithromycin 的處方。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組

學名：Clarithromycin

商品名：CLARICIN 250MG

中文名：特立適膜衣錠

腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、味覺錯亂。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C以下避光儲存。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師