
用藥指導單張

衛教小組 DA12130201

學　名：Empagliflozin

商品名：jardiance 10mg(低劑量)

中文名：恩排糖膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1.第二型糖尿病

1.1 血糖控制 用於成人及10歲以上小兒之第二型糖尿病病人。

1.2 預防心血管事件 用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，可降低心血管原因死亡的風險。

2. 心臟衰竭

用於紐約心臟學會 (NYHA) 第二級至第四級的心臟衰竭成年病人，可：

- 降低心血管死亡和心臟衰竭住院風險。
- 減緩預估腎絲球過濾率 (eGFR) 下降。

3. 慢性腎臟病

適用於患有慢性腎臟病的成人病人，以降低以下風險： 腎臟疾病惡化 (預估腎絲球過濾率 (eGFR) 持續降低、末期腎臟疾病或腎臟死亡) 或心血管死亡全因性住院。

4. 使用上的限制 JARDIANCE不建議用於第一型糖尿病病人，其可能會增加這類病人酮酸中毒的風險。

對於eGFR低於30ml/min/1.73m2的第二型糖尿病成人病人，不建議使用JARDIANCE改善其血糖控制。根據其作用機制，JARDIANCE在此情況下可能無療效。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

第二型糖尿病

JARDIANCE可單獨使用亦可與metformin、metformin併用sulfonylurea、pioglitazone (併用或不併用metformin)、胰島素(併用或不併用metformin及/或sulfonylurea)合併使用，作為附加於飲食控制及運動之外的治療藥物，藉以改善第二型糖尿病病人的血糖控制效果。JARDIANCE的建議劑量為每天早上一次、每次10 mg，可與食物一起服用，亦可空腹服用。當耐受性良好且病人eGFR

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09


用藥指導單張

衛教小組 DA12130201

學　名：Empagliflozin

商品名：jardiance 10mg(低劑量)

中文名：恩排糖膜衣錠



≥30ml/min/1.73m2，需要進一步的血糖控制時，可將劑量提升至 25 mg。

心臟衰竭

JARDIANCE 的建議劑量為每天早上一次、每次10mg，可與食物一起服用，亦可空腹服用。

慢性腎臟病

JARDIANCE 的建議劑量為每天一次、每次10mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. JARDIANCE 可引發血管內容量減少。開始使用 JARDIANCE 之後可能發生帶有症狀的低血壓，尤其在腎功能不全病人、老年人、收縮壓較低的病人，以及正使用利尿劑的病人身上。開始使用 JARDIANCE前，請先評估是否有血管內容量減少的狀況，並於適當時矯治液體容量狀態。應監測開始接受治療後是否出現低血壓的徵象和症狀，並於預期會出現血管內容量減少的臨床情境下提高監測次數。

2. 在開始使用 JARDIANCE 治療之前應先評估病人的腎功能，並在之後定期進行監測。

3. 胰島素與胰島素促泌劑已知都可能引發低血糖。JARDIANCE 與胰島素促泌劑（例如，磺醯尿素類藥物）或胰島素併用時，低血糖的發生風險較高。因此，與 JARDIANCE併用時，可能須調降胰島素促泌劑或胰島素的劑量，以減少發生低血糖的風險。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

低血壓、急性腎臟損傷及腎功能不全。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於 30° C 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09