用藥指導單張

衛教小組 DS8520101

學　名：Calcitriol

商品名：CALTSUE 2UG/ML(限洗腎用)

中文名：鈣注益注射液



一、此藥品的用途是什麼？

處理長期腎透析病人的低血鈣情況。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
本品的一般建議起始劑量，依據低血鈣和/或次發性副甲狀腺機能亢進，為1微公克（0.02微公克/公斤）至2微公克之間，每星期投與三次，大約是每隔一天投與一次。初劑量的最小劑量為 0.5 微公克，最大劑量為 4 微公克，每星期投與3次。本品可以快速靜脈注射方式投與。若是在生化指標及疾病狀況的臨床表現上未觀察到滿意的反應，可在每2到4星期的間隔內增加0.5至1微公克的劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品過量會造成高血鈣症，且在某些情況會導致高尿鈣症;因此，在調整劑量的早期階段，每個星期至少應監測兩次血中鈣及磷的濃度，如果發生高血鈣症時，應立即停止用藥。
2. 使用Digitalis的病患應小心給予本品，因為這類病患的高血鈣症可能會突發心律不整的現象。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

虛弱、頭痛、嗜睡、噁心、嘔吐、口乾、便秘、肌肉疼痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 25℃以下儲存。
2. 應避光。
3. 避免冷凍或暴露於高溫下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03