
用藥指導單張

衛教小組 DM1460101

學　名：Mycophenolic acid

商品名：MYFORTIC 180MG

中文名：睦體康腸衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

併用以 cyclosporin 的微乳劑型 (Microemulsion) 和皮質固醇以預防腎臟移植病患之急性排斥現象發生。

Myfortic 適用於在患有 WHO 第 III、IV 或第 V 類狼瘡性腎炎 (Lupusnephritis, LN) 的成人病患中作為前導治療。

此一適應症乃依據狼瘡性腎炎病患治療試驗的文獻報告，其中大多數病患屬於 ISN/RPS (2003年) 第 IV 類疾病。療效佐證是以替代指標為基準。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
建議劑量為 720毫克（睦體康腸衣錠 180毫克 4 粒或 360毫克 2 粒），一天二次（每日劑量為 1440毫克 ）。使用 mycophenolate mofetil (MMF) 2公克治療的患者，可以改用 Myfortic 720毫克每天二次治療（每日劑量 1440毫克）。

為保持腸溶膜衣的完整性，Myfortic 錠劑不可磨碎服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

常見白血球減少性白血病及腹瀉。

六、此藥儲存時的條件為何？

貯存於原包裝內，不超過30度C以上；孩童無法取得的地方。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital