# 用藥指導單張

衛教小組 DM10780101

學　名：Cefoxitin

商品名：LOFATIN (cefoxitin) INJ 2G

中文名：樂華淨注射劑




## 一、此藥品的用途是什麼？

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
依據廠商提供：

1.以2G劑量+4ml注射用水，溶解後再以5%葡萄糖水或生理食鹽水稀釋，稀釋 後僅以靜脈注射方式緩慢注射使用。

2.調配後保存25℃以下，僅能維持於24小時之內藥效不變。

1. 通常成人一日2~4g分2~4次，加蒸餾水、生理食鹽水行靜脈或點滴注射，或加0.5%Lidocaine稀釋後行深部肌肉注射。

2. 流速參考UpToDate，IVD 30~60min。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

一、慎重投與： 1. 曾與Pencillin系或Cepha系藥物過敏者。 2. 本人或雙親及兄弟中有人具有支氣管痙攣、發疹、蕁麻疹等過敏性體質者。 3. 嚴重腎障害之患者。 4. 經口攝取不良或非經口營養之患者，高齡者、全身狀況不良之患者。二、溶解後須儘速使用，若須保存時儲存與25℃以下可保存24小時，在2～8℃可保存5天以內使用。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

腹瀉、腸胃不適、胃痛等。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26