用藥指導單張

衛教小組

學　名：Verapamil

商品名：U-SODIN ★ INJ. 5MG/2ML

中文名：優賜定注射液



一、此藥品的用途是什麼？

陣發性上室性心搏過速、對於心房撲動、心房纖維顫動情況時、快速心室心搏之暫時性控制。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人一次1 AMP，必要時一天可注2～3次，限緩慢靜脈注射。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.若發生血壓下降時，可使用Dopamin、Dobutamine，或Norepinephrine。

2.孕婦初期三個月，應特別小心使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

輕微及短暫的血壓下降，偶有發生面部潮紅。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20