用藥指導單張

衛教小組 DM8150201

學　名：Piperacillin+Tazobactam

商品名：TAPIMYCIN 2.25GM

中文名：達比黴素注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

對PIPERACILLIN具有感受性，以及對PIPERACILLIN具抗藥性但對PIPERACILLIN/TAZOBACTAM有感受性之β-LACTAMASE產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1.劑量：一般劑量為3.375g（3g piperacillin及0.375g tazobactam）q4-6h，腎功能不全病患應視腎功能調整劑量；Ccr為20-40 mL/min時，建議劑量為2.25g q6h，Ccr <20 mL/min時，建議劑量為2.25g q8h。

2.用法：每小瓶須用至少10mL的稀釋液（無菌水、0.9%NaCl或D5W）先行將瓶內的粉末溶解，再加入可相容之稀釋液（至少50mL），靜脈輸注時間須超過30分鐘。注意Lactated Ringer Solution不可和Tapimycin配伍。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.腎功能不全的病患應視腎功能調整劑量。

2.長期使用本品治療，須定期監測肝、腎及血液系統。

3.因本品為鈉鹽製劑，對於體內鉀的貯存量太低、或可能產生低血鉀（如使用利尿劑或Cytotoxic Drugs）的病人，需定期監測電解質濃度，此外，對於限制鈉攝取的患者，也要小心使用。

4.併用高劑量Heparin、口服抗凝血劑或其他會影響凝血系統的藥品，需嚴密監測凝血功能。

5.使用於孕婦及小於12歲孩童的安全性尚未建立。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

常見之副作用為胃腸道不適、過敏反應及頭痛等。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25

用藥指導單張

衛教小組 DM8150201

學　名：Piperacillin+Tazobactam

商品名：TAPIMYCIN 2.25GM

中文名：達比黴素注射劑



六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25