

用藥指導單張

衛教小組 DG15170201

學名：Dutasteride+Tamsulosin
商品名：DUODART CAP 0.5MG/0.4MG
中文名：多適達膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

具有症狀且攝護腺增大之攝護腺肥大症的第二線治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成年男性(含老年人)建議劑量為一天口服一顆膠囊(0.5 毫克/0.4 毫克)，在每日固定同一餐後約30 分鐘服用。

必須曾經接受tamsulosin 0.2mg，並因療效不足而需調整劑量至0.4mg，效果仍不佳時，方可使用。膠囊需整顆吞服，切勿嚼食或將膠囊打開。直接接觸硬膠囊內之dutasteride 膠囊，可能會對口咽部黏膜造成刺激。

三、使用時我該注意的特別事項？

和其他的 α -腎上腺素阻斷劑一樣，使用含 tamsulosin 成分之產品(包括DUODART)治療的病人可能會發生直立性低血壓(姿勢性低血壓、頭暈及眩暈)，並可能會導致昏倒。應提醒剛開始使用 DUODART 治療的病人，要避免昏倒時會造成受傷的狀況。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

姿態性低血壓、性功能降低、乳房增大及壓痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

應儲存於25°C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師