

用藥指導單張

衛教小組 DL13260101

學名：Paliperidone

商品名：invega sustenna inj 150mg

中文名：善思達持續性藥效肌肉注射懸浮劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. 治療思覺失調症。
2. 分裂情感障礙症之急性治療的單一治療藥物或作為情緒穩定劑及(或)抗憂鬱劑的輔助用藥。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

INVEGA SUSTENNA僅供肌肉注射使用。切勿透過任何其他途徑給藥。應小心避免不慎注入血管。應一次注射全部劑量。切勿將一劑分成數次施打。

應緩慢注入深部三角肌或臀部肌肉。投予INVEGA SUSTENNA時僅可使用INVEGA SUSTENNA包裝中所提供的針頭。

將INVEGA SUSTENNA注入手臂三角肌時所使用之針頭的建議型號須視病人的體重而定：

- 對體重未達90公斤的病人，建議使用1吋的23號針頭。
- 對體重達90公斤(含)以上的病人，建議使用1½吋的22號針頭。
- 進行手臂三角肌注射時應交替使用兩側的手臂三角肌。

將INVEGA SUSTENNA注入臀部肌肉時，不論病人的體重為何，所使用之針頭的建議型號皆為1½吋的22號針頭。

應注射於上外側四分之一的臀部肌肉。進行臀部肌肉注射時應交替使用兩側的臀部肌肉。

思覺失調症與分裂情感障礙症

開始使用INVEGA SUSTENNA時的建議起始療程為於治療的第一天投予234毫克(paliperidone 150毫克當量)、再於第八天(即一週後)投予156毫克

(paliperidone 100毫克當量)，且兩劑都應注射於手臂三角肌。在投予第二劑起始劑量之後，每月一次的維持劑量可注射於手臂三角肌或臀部肌肉。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL13260101

學名：Paliperidone

商品名：invega sustenna inj 150mg

中文名：善思達持續性藥效肌肉注射懸浮劑



的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

六、此藥儲存時的條件為何？

請貯存於30° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師