


用藥指導單張

衛教小組 DR8690101

學名：Droperidol

商品名：DROPEL★ 2.5MG/ML (限麻醉科用)

中文名：卓普注射液



一、此藥品的用途是什麼？

DROPERIDOL適用於降低由於手術及診斷程序所造成之噁心、嘔吐。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量必須依照年齡、體重、身體狀況、現有之病理狀況、其他使用中之藥品與使用之麻醉劑種類及手術之程序個別化調整。同時需進行例行性之Vital signs 及 ECG 監測。

成人劑量：最大初始劑量為2.5 mg IM or slow IV，另可增加投與1.25 mg 之劑量以達到期望之作用，然而增加投與之劑量必須在潛在利益大於潛在危險性時小心投藥。

小孩劑量：2 至12 歲之小孩，最大初始劑量為每公斤投與0.1 mg IM or slow IV，並將病人之年齡及其他臨床因子納入考量，然而增加投與之劑量必須在潛在利益大於潛在危險性時小心投藥。

三、使用時我該注意的特別事項？

Droperidol 對於已知或懷疑有QT 波延長之病人時需極度小心(如：充血性心衰竭，心搏過慢，使用利尿劑、低血鉀、低血鎂或其他已知使用後會延長QT 波之藥物)，其他之危險因子包括年齡超過65 歲，酒精濫用、及使用其他藥品如：benzodiazepines. volatile anesthetics. 及 IV opiates。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

中樞神經作用：Droperidol 可能產生類帕金森氏症或運動不能性之錐體外徑副作用，然此類副作用於抗帕金森藥物或抗膽鹼藥物治療後為可逆性反應。少數病例可能有逆理反應，包括幻覺、靜坐不能或憂慮等。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DR8690101

學名：Droperidol

商品名：DROPEL★ 2.5MG/ML (限麻醉科用)

中文名：卓普注射液



藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師