用藥指導單張

衛教小組 DA0730201

學　名：Ezetimibe

商品名：EZETROL 10MG

中文名：怡妥錠



一、此藥品的用途是什麼？

高膽固醇血症、同型接合子性麥硬脂醇血症(植物脂醇血症)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Ezetrol的建議劑量為10mg，每天服用一次，單獨投與或與statin類藥品合併投與。EZETROL可以在一天中的任何時候服用，隨餐或空腹均可。

單一療法

用於腎臟功能受損患者時，不需要調整Ezetrol的劑量。

併用Simvastatin療法

在腎功能不全的病人不需要調整Ezetrol的劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

當Ezetrol與statin類或fenofibrate藥物合併投與時，請參考該藥品的仿單。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、肌痛、腹瀉、以及肝臟酵素升高。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存溫度為30℃以下，併防潮濕。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02