

用藥指導單張

衛教小組 DC7070101

學名：Levetiracetam

商品名：KEPPRA（注射）FOR INFUSION 500MG/5ML

中文名：優閒濃縮輸注液



一、此藥品的用途是什麼？

暫時不宜或無法口服抗癲癇藥物治療之下列癲癇患者：十六歲以上病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)之單獨治療。四歲以上孩童或成人病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)，十二歲以上青少年與成人病患之肌抽躍性癲癇發作，以及十六歲以上青少年與成人患有體質性泛發性癲癇的原發性泛發性強直陣攣發作之輔助治療

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

單獨治療：

成人及十六歲以上的青少年：

使用時建議以每天兩次每次250 mg開始，兩星期後增加劑量到每天兩次每次500 mg達起始治療劑量。視病人的臨床反應，劑量可再調高，以每兩星期增量500 mg(當日分兩次，每次增加250 mg)為一階段進行。最高劑量為每日3000 mg(分兩次，每次1500 mg)。

輔助治療：

成人(十八歲以上)及體重五十公斤以上的青少年(十二至十七歲) 初始劑量為每日1000 mg(每日兩次，每次500 mg)。此劑量可始於治療的第一天。視病人的臨床反應及耐受性，每日劑量可增加到最高每日3000 mg(分兩次，每次1500 mg)。當欲改變劑量時，應以每二至四星期增量或減量1000 mg(當日分兩次，每次增/減500 mg)為一階段進行。

孩童(四至十一歲)及體重五十公斤以下的青少年(十二至十七歲)：

初始劑量為每天兩次，每次10 mg/kg。視病人的臨床反應及耐受性，劑量可增加到最高每次30 mg/kg，每日兩次。當欲改變劑量時，應為階段式進行。以每二星期增量或減量20 mg/kg(當日分兩次，每次增/減10 mg/kg)。但應維持在最低有效劑量。體重五十公斤以上的孩童其劑量大致與成人相同。

三、使用時我該注意的特別事項？

依據臨床經驗，若服用Keppra後又必須停藥時，建議分階段性減量，例如：成人：每二至四星期減量1000毫克(當日分二次，每次各減500毫克)；孩童：劑量遞減時應每二星期以不超過減量20 mg/kg(當日分兩次，每次減10 mg/kg)為一階段進行。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DC7070101

學名：Levetiracetam

商品名：KEPPRA（注射）FOR INFUSION 500MG/5ML

中文名：優閒濃縮輸注液



四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常被通報的不良反應為暈眩、嗜睡、頭痛、無力感、倦怠。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於30℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師