

用藥指導單張

衛教小組 DM6360201

學名：Flumazenil

商品名：ANEXATE 0.5MG

中文名：安易醒注射液



一、此藥品的用途是什麼？

用於麻醉及加護病房時回轉Benzodiazepine之中樞鎮靜作用。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Anexate建議只能以靜脈注射給藥，且應由麻醉醫師或有經驗的醫師給予。

應以逐漸調整劑量來達到預期效果。有些benzodiazepines的作用時間可能超過Anexate的作用時間，因此當病人清醒後再次出現鎮靜作用時，重覆給藥也許是需要的。

麻醉：建議Anexate起始劑量為0.2 mg，靜脈注射超過15秒。若在第一次靜脈注射後60秒內未達到所需的意識程度，可注射第二次劑量（0.1 mg）；並視情況需要可以60秒鐘間隔重覆注射，直到總劑量達1 mg。一般劑量為0.3–0.6 mg，但個別的劑量需要可能會因為所給予的benzodiazepines的劑量和作用時間，以及病人的體質等因素而出現相當大的差異。

加護病房及未知來源的喪失意識之處理：建議Anexate起始劑量為靜脈注射0.3 mg。若60秒內未達到所需的意識程度，可重覆給予Anexate直到病患甦醒或至總劑量達2 mg。若嗜睡再發生，可再給予如上述劑量一次或更多次靜脈注射，或每小時靜脈輸注0.1–0.4 mg。輸注速率應依個別調整，以達到想要的甦醒程度。

當Anexate被抽入注射筒內或以生理食鹽水或5% dextrose稀釋後若未使用，24小時後應即丟棄。為維持理想的無菌狀態，Anexate應保持在安瓿內，直到即將使用前方才抽入注射筒內。

三、使用時我該注意的特別事項？

警告病人應在給藥後的最初24小時內不得進行需要全神貫注的危險活動(如操作危險的機械或開車)，因為原來服用或注射benzodiazepines的作用(例如鎮靜作用)可能再出現。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM6360201

學名：Flumazenil

商品名：ANEXATE 0.5MG

中文名：安易醒注射液



無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

在快速注射Anexate之後，如感覺焦慮、心悸和恐懼的副作用曾經出現，但不常見。這些副作用通常不需要特別處理。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥物如超過包裝上的保存期限 (EXP) 時，請勿使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師