用藥指導單張

衛教小組 DA13840101

學　名：Bumetanide

商品名：BUSIX 1MG

中文名：必得寧錠



一、此藥品的用途是什麼？

水腫、利尿。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
通常每天早晨口服1mg，若情形需要，可隔6-8小時再服1mg。病情嚴重者可增加劑量至獲得滿意效果，雖然腎臟衰竭所引起的抗性水腫，每天曾可用至40mg，但很少需要超過4mg。

小孩：每天每公斤體重0.03－0.06mg。

老年人：依據病人的反應而調整劑量，某些病人每天0.5mg即夠。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本劑之利尿起始效用迅速，會有電解質平衡失調，脫水現象發生，應注意之，因此先少量投與再徐徐增量。
2. 連續使用本劑會有電解質平衡失調現象，應作定期檢查。
3. 慎重投與：

(a)進行性肝硬變症患者。
(b)肝功能不全之患者。
(c)腎功能不全之患者。
(d)本人及雙親、兄弟有痛風、糖尿病之患者。
(e)下痢、嘔吐之患者。
(f)使用Digitalis劑，糖質副腎皮質荷爾蒙及ACTH之患者。
(g)連續使用利尿劑之患者。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

(a)代謝異常一時有低鈉血症、低鉀血症、低Cl－性鹼血症等電解質平衡失 調之現象。若有高尿酸血症、高尿素氮素血症、高血糖症出現時，須 小心觀察，有異樣隨時減量或停藥。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

用藥指導單張

衛教小組 DA13840101

學　名：Bumetanide

商品名：BUSIX 1MG

中文名：必得寧錠



(b)過敏症－當皮膚出現疹子，搔癢感等過敏現象時，應中止用藥。
(c)消化器－時有噁心、嘔吐、食慾不振、胃部不快感、腹痛、下痢等現 象發生。
(d)精神、神經系統－時有耳鳴、重聽惡化、頭暈、步履蹣跚、知覺異常、 手指振顫及頭痛等現象發生。
(e)其他－時有四肢無力、倦怠感、口渴、筋肉疼痛、筋痙攣、心悸、心 窩部疼痛、罕有脫水現象、糖尿、嗜酸性血球增多、關節疼痛現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

避光保存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15