

用藥指導單張

衛教小組 DQ0070101

學名：Anastrozole

商品名：ARIMIDEX ★ 1MG

中文名：安美達錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 停經後雌激素接受器為陽性或不清楚之局部晚期或轉移性乳癌第一線治療。2. 停經後婦女晚期乳癌，雌激素接受器陰性，但曾對TAMOXIFEN有陽性反應者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 成人(包括老人)：口服一天一錠(1mg)。
2. 腎功能損傷：輕度或中度腎功能不良之病人，不建議調整劑量。
3. 肝功能損傷：對有輕度肝病的病人，不建議調整劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 對於任何荷爾蒙狀態有疑問的病人，其停經與否應以生化指標來界定。
2. 無資料可支持本品用於中度或嚴重肝損傷病人或嚴重腎損傷(creatinine廓清率低於20ml / min)病人之安全性及有效性。
3. 本品不太會影響病人開車或操作機械的能力。然而，曾有報告顯示使用本品會無力和嗜睡，故當這樣的症狀持續時，開車或操作機械時需小心。
4. 本藥會干擾progesterone、androgens及estrogens的血中濃度，增加血中總膽固醇及LDL濃度。
5. 過量處理：過量時並無特定的解毒劑，應依症狀給予治療。對於藥物過量的處理，應考慮病人已服用多種藥劑的可能性。若病人意識清楚，可加以催吐。由於本品與血中蛋白質結合率並不高，因此血液透析法可能有所助益。必要時可給予一般的支持療法。
6. 服用本品的病人須定期監測血液、肝功能和血脂肪濃度。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ0070101

學名：Anastrozole

商品名：ARIMIDEX ★ 1MG

中文名：安美達錠



在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

常見的副作用包括熱潮紅，陰道乾澀和毛髮稀疏，也可能引起胃腸不適(缺乏食慾、噁心、嘔吐和腹瀉)、無力、嗜睡、頭痛或發疹，罕有陰道出血、血栓或肝功能變化。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師