

用藥指導單張

衛教小組 DE11190101

學名：Linagliptin
商品名：TRAJENTA 5MG
中文名：糖漸平膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

第二型糖尿病。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. TRAJENTA 的建議劑量為 5mg，成人每天一次。
2. 可單獨使用亦可與 metformin、sulfonylurea、PPAR γ 作用劑(如 thiazolidinediones) 合併使用，作為飲食控制及運動的輔助療法，以改善血糖的控制。
3. TRAJENTA 錠劑可與食物一起服用，亦可空腹服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

與已知可引發低血糖症的藥物併用

胰島素促分泌物質可能引發低血糖症。在臨床試驗中，相較於安慰劑，TRAJENTA 與胰島素促分泌物質（例如，磺醯尿素類藥物）併用時的低血糖症發生率較高；因此，與 TRAJENTA 併用時，可能須降低胰島素促分泌物質的劑量，以減少低血糖症的風險。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

可能有關節痛、背痛、頭痛、低血糖或鼻咽炎的情形。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於30℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師