用藥指導單張

衛教小組 DD12670201

學　名：Famotidine

商品名：ULSTOP F.C.20MG(FAMOTIDINE)

中文名：悅潰止膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血(消化性潰瘍、急性stress潰瘍、出血性胃炎而引起的)、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
通常成人1 次F amotidine 20mg，1 日 2 次（早餐後、晚餐後或睡覺前經口投與。或者1 次40mg，1 日1 次（睡覺前）經口投與亦可。

三、使用時我該注意的特別事項？

治療期間，應充分觀察，並依病狀使用治療所需的最小劑置：使用本劑若未見效果時，請改用其他療法。
此外，必須注意血液常規、肝功能、腎功能等檢查數值的變化。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

便秘，腹瀉。

六、此藥儲存時的條件為何？

避光室溫（25℃ 以下）儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.05