用藥指導單張

衛教小組 DA15920101

學　名：Nifedipine

商品名：ATANAAL 5MG

中文名：壓達能軟膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

狹心症（心絞痛）：包括血管痙攣性心絞痛，慢性穩定型心絞痛。

高血壓：使用Nifedipine短效劑型治療高血壓，可能會發生血壓驟降、反射性心博加速而引起心血管併發症。

僅在無其他適合療法時，才可使用Nifedipine短效劑型治療高血壓，且不建議舌下投予Nifedipine膠囊。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本藥須由醫師處方使用。

劑量因人而異，過量會引起低血壓。

起始劑量：每次 10~20 mg，一天三次。每日最高劑量 180 mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

10%使用Nifedipine的患者，會因動脈血管擴張而引起輕微到中度水腫，主要出現於下肢，可用利尿劑緩解。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. Nifedipine 有較強的血管平滑肌作用，因血管擴張易發生頭痛、潮紅等副作用。

2.本藥很少出現副作用，如有的話，也只有發生在初期治療的時候，而且短暫、輕微，偶發症狀 可能是頭痛、暖熱感、眩暈和嘔吐。

3.有嚴重腎功能障礙者，BUN及 Creatinine 會上升。

4.過敏症：發疹、搔癢等現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

請於室溫下避光乾燥處儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20