

用藥指導單張

衛教小組 DE4500101

學名：Vildagliptin

商品名：GALVUS 50MG

中文名：高糖優適錠



一、此藥品的用途是什麼？

第二型糖尿病：

作為單一治療

– 針對僅經由運動與飲食無法良好控制的患者，以及因不耐受或是禁忌症而認為不適合使用metformin的患者。

作為合併治療

– 宜用於已使用metformin或sulphonylurea或thiazolidinedione且血糖控制不佳者。

作為三合一治療

– 當飲食及運動加上sulphonylurea及metformin雙重療法無法提供適當的血糖控制時，vildagliptin可與sulphonylurea及metformin併用作為三合一口服療法。

當飲食及運動加上穩定劑量的胰島素無法提供適當的血糖控制時，vildagliptin亦適合與胰島素合併使用(併用或不併用metformin)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人：

Vildagliptin 作為單一治療使用、與metformin 合併使用、與thiazolidinedione 合併使用、與metformin 及sulphonylurea 合併使用，或與胰島素合併使用(併用或不併用metformin)時，vildagliptin 每日建議劑量為100 毫克，分別於早晨與晚間服用50 毫克。

若與sulphonylurea 合併使用，vildagliptin 每日建議劑量為50 毫克，每日一次早晨服用。對此類病人而言，每日vildagliptin100 毫克之劑量，並沒有較50毫克有效。

與sulphonylurea 合併使用時，可考慮使用較低劑量的sulphonylurea，以減少低血糖的風險。

使用劑量不建議使用高於100 毫克。

如果錯過Galvus 之服用時間，病患應於記起時儘速服用。不應於同日服用雙倍的

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DE4500101

學名：Vildagliptin

商品名：GALVUS 50MG

中文名：高糖優適錠



劑量。

針對vildagliptin 與metformin 及thiazolidinedione 合併作為三合一口服療法的情況，目前尚未確立相關的安全性及療效。

特殊族群之資訊

老年患者(大於等於65 歲)

老年患者不需調整劑量。

腎功能不全：

對輕度腎功能不全(肌酸酐廓清率大於等於50ml/min)的患者而言，無需調整劑量。

對於中度或重度腎功能不全以及必須接受洗腎之末期腎臟疾病(ESRD)患者而言，Galvus®的建議劑量為每日一次50mg。

肝功能不全：

Galvus® 不建議使用於肝功能不全的患者，包括治療前ALT 或AST 大於正常值上限3 倍者。

老年患者(大於等於65 歲)

老年患者不需調整劑量。

小兒患者 (小於18 歲)

因為缺乏此族群之安全及療效資料，Galvus®不建議使用於18 歲以下之兒童青少年患者。

給藥方式

口服使用。

Vildagliptin 可於餐前或餐後服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

全身性

對胰島素依賴的患者來說，Galvus並非胰島素的替代品。Galvus不適用於第一型糖尿病患者或治療糖尿病酮酸血症。

腎功能不全

對於接受洗腎之末期腎臟疾病(ESRD)患者的臨床使用經驗有限。因此需謹慎使用Galvus於此類患者。

肝功能不全

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DE4500101

學名：Vildagliptin

商品名：GALVUS 50MG

中文名：高糖優適錠



Galvus不建議使用於肝功能不全的病患，包括治療前ALT 或AST 大於正常值上限 3 倍者。

肝功能監測

曾有肝功能異常（包括肝炎）的罕見個案通報。在這些案件中，患者通常無症狀，沒有臨床後遺症，且肝功能監測結果在停藥後回復正常範圍。肝功能監測需在開始使用Galvus前進行，以了解病患之基礎值。在使用Galvus治療的第一年內，建議每三個月需進行一次肝功能測試，直至一年，之後建議定期監測，且當病人有噁心、嘔吐、倦怠、上腹不適、黃疸等可能為肝傷害之症狀或症狀發生時，宜檢測肝生化值(ALT)。患者的肝臟轉胺酶濃度若增加，則應進行第二次肝功能監測加以確認，並應持續進行肝功能測試追蹤，直至回復正常為止。若病患之AST或ALT 值持續超過正常值上限3 倍或更高，則建議病患退出Galvus治療。

患者若出現黃疸或其他肝功能異常的徵兆，應停止使用Galvus。

在退出Galvus治療與肝功能回復正常值之後，不應再度使用vildagliptin。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

震顫、頭痛、頭暈、噁心、低血糖。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於30℃以下，避免潮濕。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師