

用藥指導單張

衛教小組 DM16510101

學名：Amoxicillin

商品名：AMOXICILLIN 250MG

中文名：愛默士黴素膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

葡萄球菌，鏈球菌，肺炎雙球菌，腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

上呼吸道感染症：病原菌種由 Streptococci, Pneumococci, Nonpenicillinase producing Staphylococci, H. influenzae 引起者，適應症：

中耳炎，鼻竇炎，咽喉炎，扁桃腺炎。

生殖泌尿道感染症：病原菌種由 E. coli, Proteus mirabilis, Streptococcus faecalis 引起者，適應症：

膀胱炎，腎盂炎，尿道炎。

皮膚及軟部組織感染症：病原菌種由 Streptococci, Staphylococci, E. coli 引起者，適應症：

癰疽癰瘡，蜂窩狀組織炎，外傷，骨髓炎，心內膜炎，膽囊炎：

上述適應症之用法：成人：250mg~500mg 每8小時一次。

小孩：20mg~40mg/公斤/日，每8小時一次；

若小孩體重達20公斤以上，則依成人劑量投藥，症狀消除後，仍宜繼續治療 2~3 天。

急慢性支氣管炎、肺炎之用法用量：成人：500mg 每8小時一次。

小孩：40mg/公斤/日，每8小時一次；

若小孩體重達20公斤以上，則依成人劑量投藥，症狀消除後，仍宜繼續治療 2~3 天。

下呼吸道感染症：病原菌種由 Streptococci, Pneumococci, H. influenzae 引起者，適應症：急慢性支氣管炎，肺炎。

用法：

成人：500mg 每 8 小時一次，小孩：40mg /公斤/ 日，每 8 小時一次若小孩體重達 20 公斤以上則依成人劑量投藥。

淋病與急性無併發症之生殖泌尿系感染症：病原菌種由 N. gonorrhoeae 引起者（男女性皆同），適應症：淋病。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM16510101

學名：Amoxicillin

商品名：AMOXICILLIN 250MG

中文名：愛默士黴素膠囊



用法：

成人：3gm作單一口服劑量使用，疑有梅毒之淋病患者，須作 Darkfield 檢查，治療後應至少四次按月作血清試驗。

三、使用時我該注意的特別事項？

長期治療使用時，須定期作肝臟、腎臟和造血機能檢查。治療期間若復感染黴菌性或細菌性病原時，須適時停藥，再建立新的治療體系。

本藥須由醫師處方使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

除了對青黴素過敏者外無嚴重的副作用，若有胃腸不適發生，亦極輕微罕見。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於 25℃ 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師