

用藥指導單張

衛教小組 DA16290101

學名：Warfarin

商品名：cofarin(低劑量)★ 1mg (抗凝血)

中文名：可化凝錠



一、此藥品的用途是什麼？

靜脈栓塞症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 初劑量：初劑量由每日 2mg 至 5mg 開始使用，並依 PT/INR 測量值調整劑量。
2. 維持劑量：多數病人以每日 2mg 至 10mg 劑量皆可獲得滿意的維持效果，可藉錠劑刻痕分成半錠來彈性調整劑量，個別病人的劑量與時間間隔須依凝血酵素原反應決定。
3. 治療時間：治療時間長短須依個別病人調整，但一般而言，抗凝血治療須持續至血栓與栓塞發生的危險期結束為止。
4. 忘記服藥：本品的抗凝血效果持續24小時以上，如果病人於規定時間忘記服藥，應儘早於同一天補服該劑，病人不可藉著加倍服藥來補足忘記服用的藥量，應向醫師求教。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 接受任何手術、拔牙治療、侵入性檢查前，請告知醫師有服用抗凝血劑。
2. 併用其他食物、中草藥等對本品藥效的影響：降低抗凝血的藥效、容易導致血栓：富含維他命K的食物(例如食用大量綠色蔬菜、花椰菜、甘藍菜、菠菜、內臟、綠茶)、輔酶 Q10(結構與維他命K相似)、諾麗果、貫葉連翹等。增加抗凝血的藥效、增加出血的風險：維他命E、鳳梨酵素、魚油、銀杏、黨蔘、當歸、大蒜、人蔘、甘菊茶、小紅莓產品等。

服藥期間避免飲酒，以免影響抗凝血劑的作用。

3. 定期測量 PT/INR 值或其它適當凝血試驗是必要的。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

本品可能引發的副作用包括：*任何組織或器官的致命性或非致命性

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DA16290101

學名：Warfarin

商品名：cofarin(低劑量)★ 1mg (抗凝血)

中文名：可化凝錠



出血，此乃因抗凝血劑作用結果。出血徵象、症狀、或嚴重程度將依出血部位或出血程度而異。出血的併發症有：麻痺；感覺異常；頭痛，胸痛，腹痛，關節痛，肌肉痛，或其它疼痛；眩暈；呼吸急促，呼吸或吞嚥困難；不明原因的腫脹；虛弱；低血壓；或不明原因的休克。因此，當接受抗凝血治療病人有任何無明確診斷病因的抱怨時，則應評估病情有出血的可能。接受抗凝血治療期間，出血情況不一定與PT/INR值相關(參見「用藥過量-治療」)。

*當PT/INR值處於治療範圍而發生出血時，必須詳加診斷，可能揭露出過去未懷疑的病灶，例如，腫瘤、潰瘍等。*皮膚和其它組織壞死(參見「警語」)。

*較不常見的副作用包括：過敏反應，全身性膽固醇微小栓塞，紫色足趾症候群，肝炎，膽汁鬱滯性肝臟傷害、黃疸，肝臟酵素數值增高、血管炎、水腫、貧血、發燒、發疹、皮膚炎包括水泡性發疹、蕁麻疹、腹痛包括絞痛、胃腸積氣/脹氣、倦怠、嗜睡、不適、衰弱無力、噁心、嘔吐、腹瀉、疼痛、頭痛、暈眩。味覺倒錯、搔癢、禿髮、不耐寒冷和感覺倒錯包括感覺寒冷和寒顫。長期接受Warfarin治療曾有引起氣管或支氣管鈣化之報導，但罕見，其臨床意義未明。抗凝血治療曾引起異常勃起，但原因尚待確立。

六、此藥儲存時的條件為何？

請置於25℃以下陰涼乾燥處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師