用藥指導單張

衛教小組 DB5460301

學　名：Bromhexine

商品名：BISOLVON SOLUTION 50ML

中文名：氣舒痰液



一、此藥品的用途是什麼？

1.所有伴有病理性分泌物形成之呼吸系統疾病包括：感冒。支氣管炎，慢性阻塞性肺疾9COPD)，支氣管擴張症，肺氣腫，矽肺症。2.預防手術後併發症。3. ICU，CCU。患者呼吸道清淨作用。4.促進支氣管造影劑的排出。5.意識不清患者，呼吸道的清淨作用。

祛痰。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
口服(1)成人、14歲以上兒童：每次4-8ML，每日三次。(2) 6～14歲小兒：每次4ML，每日三次。(3)6歲以下幼兒：每次2ML，每日二次。

開始治療時，成人每日總計量可能增加至48ML

吸入(1)成人及6歲以上兒童: 每次4ML，每日二次。(2)2-6歲兒童: 每次2-4ML，每日二次。(3)2歲以下兒童: 每次2ML，每日二次。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

病人服藥之初，支氣管粘液被溶解，痰量增加，咳嗽可能會稍微加劇。曾有腹瀉、噁心、嘔吐及其他輕微胃腸副作用報告。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.08