
用藥指導單張

衛教小組 DG10740101

學　名：Oxybutynin

商品名：OXBU EXTENDED TAB 5MG

中文名：歐舒緩釋錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
本品係為每日服用一次。本品的建議起始劑量為每天5毫克。可以每次增加5毫克的方式來調整劑量，以在療效及耐受度之間達到一個平衡（最大劑量為每天30毫克）。一般而言，劑量調整間隔約為每個星期。兒童使用：建議初始劑量為每天5 mg。可以每次增加5 mg的方式來調整劑量，以在療效及耐受度之間達到一個平衡（最大劑量為每天20 mg）。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品需在液體的輔助下吞服，不能咀嚼、或壓碎本品。
2. 此藥品未經研究過對駕駛及使用機械時之影響為何，因為抗膽鹼藥物，可能會造成昏沉（嗜眠）或視覺干擾，須告知病人要小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

口乾、便秘、腹瀉、噁心、視覺模糊、散瞳、眼睛乾、頭痛、思睡、皮膚過敏。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25度以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.12