用藥指導單張

衛教小組 DM4400201

學　名：Neomycin

商品名：NEOMYCIN 0.25GM

中文名：紐奧黴素膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

手術前或肝昏迷之病人用於腸道局部殺菌。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1.腸管感染症：成人一日八顆，分四次服用。

2.腸管手術前處理時，成人一日16粒，每日分四回服用，連續服用1-3天。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、腹瀉、發紅、搔癢、皮膚炎；嚴重者-神經肌肉阻斷、呼吸麻痺、耳毒性、腎毒性。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.13