用藥指導單張

衛教小組 DA9920101

學　名：Nebivolol

商品名：NEBILET 5MG

中文名：耐比洛錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療原發性高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

高血壓

成人

建議每日固定時間服用一錠耐比洛(5毫克)。

服藥1~2周後有明顯的降血壓效果。通常服藥4周後能達到最大療效。

腎功能不全患者

針對腎功能不全的患者，建議的起始劑量為每日2.5毫克。若需要，劑量可調整至每日5毫克。

老年患者

65歲以上的患者，建議起始劑量為每日2.5毫克。若需要，劑量可調整至每日5毫克。

使用方式

口服，本藥可隨餐服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

慢性阻塞性肺病的患者使用β-腎上腺受體拮抗劑應謹慎，因為可能加重呼吸道收縮。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、頭暈、感覺異常。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於30℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.28