用藥指導單張

衛教小組 DM3970101

學　名：Doxycycline

商品名：DOXYMYCIN 100MG

中文名：多喜黴素腸溶膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

革蘭氏陽性菌、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
通常成人開始治療的第一天服用2粒，此後每天服用1粒（首日之2粒可一次服用，也可分成二次，每隔12小時服用一次），若用以治療嚴重的病例時亦可使用每日2粒之劑量直到痊癒為止。

三、使用時我該注意的特別事項？

本藥宜整粒吞服，不宜研磨或咬碎，以免破壞腸溶性，在胃中崩解而刺激胃部；牛奶或制酸劑可能溶解腸衣膜，故不宜同時使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

光敏感的病人在本藥治療期間應避免日光直射，如發現皮膚不適，則應立即停藥。使用本藥偶有噁心、嘔吐、腹瀉、陰道炎、皮膚炎、舌炎、胃炎、直腸炎發生。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫（15～30℃）、避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25